



## Technisches Merkblatt

### Brantkalk 77

### körnig

#### Allgemeines

Durch Auswaschung und Säureneutralisation kommt es zu natürlichen Kalkverlusten im Boden, wodurch dessen pH-Wert sinkt. Der Einsatz von Düngekalken wirkt dieser Entwicklung entgegen.

Das Anheben auf den für den jeweiligen Boden korrekten pH-Wert durch den Einsatz von Kalk begünstigt die Mikrobentätigkeit und sorgt für eine bessere Verfügbarkeit wichtiger Nährstoffe, wie Stickstoff, Phosphat und verschiedener Spurennährstoffe.

Bei mittleren bis schweren Böden verbessert der Einsatz von Kalk die Bodenstruktur in Verbindung mit der Schaffung einer günstigen Porenverteilung. Dies dient der Luft- und Wasserführung im Boden. Es wird darüber hinaus eine höhere Tragfähigkeit und die leichtere Bearbeitbarkeit des Bodens erreicht.

#### Anwendung

Zu den meisten Kulturen und auf allen Böden bei Kalkbedarf.

Nicht anwenden bei säureliebenden Pflanzen im Gartenbau, wie z.B. Rhododendron oder Moorbeetpflanzen.

Nicht auf feuchten oder nassen Aufwuchs ausbringen –

#### Verätzungsgefahr!

Die Ausbringung erfolgt mit den üblichen Düngerstreuern oder per Hand.

Falls keine besondere Anwendungsempfehlung seitens der amtlichen Beratung herausgegeben wurde, empfiehlt sich die Anwendung nach der Kalkbedarfsbestimmung des VDLUFA.

#### Anwendungsempfehlung

Je nach Bodenuntersuchungsergebnis auf Acker- und Grünlandflächen jährlich 5 – 7 dt/ha **Brantkalk 77**. Im Rahmen der Fruchtfolge kann die Kalkung für mehrere Jahre (max. 4 Jahre) zusammengefasst werden. Dann ist die Ausbringmenge mit der Anzahl an Jahren für eine Rotation zu multiplizieren. Auf Garten- und Rasenflächen jährlich 50 – 70 g/m<sup>2</sup> im Herbst oder zeitigen Frühjahr ausbringen.

Bereits versauerte Böden benötigen höhere Gaben **Brantkalk 77**. Zu deren Bemessung sind die Angaben aus der Empfehlung laut Bodenuntersuchungsergebnis heranzuziehen.

**Brantkalk entfaltet seine volle Wirkung nur, wenn er unmittelbar nach der Ausbringung flach so in den Boden eingearbeitet bzw. eingeharkt wird, dass er mit der vorhandenen Bodenfeuchtigkeit in Kontakt kommt. Auf Rasenflächen zweckmäßigerweise im Frühjahr im Rahmen des Vertikutierens einsetzen.**

#### Herstellung

Otterbein Brantkalk 77, körnig wird durch Brennen von Kalkstein hergestellt.

#### Lieferung

In 25 kg-Säcken

In Big Bags ca. 1 t  
als lose Ware

#### Lagerung

Vor Feuchtigkeit schützen. Die Lagerdauer soll 9 Monate nicht überschreiten. Wegen Brandgefahr nicht in der Nähe von leicht entzündlichen Stoffen (z.B. Stroh, Heu) lagern.

#### Produktdaten

CaO:	75 %
MgO:	2 %
Korngröße:	0 – 6 mm
Neutralisationswert:	77% CaO
ph-Wert:	≥ 12

#### Sicherheitshinweise

Das Produkt reagiert mit Wasser stark alkalisch, deshalb Haut und Augen schützen, bei Berührung gründlich mit Wasser spülen, bei Augenkontakt unverzüglich Arzt aufsuchen.

#### Qualitätsüberwachung

Otterbein Brantkalk 77, körnig wird in unserem Werkslabor, sowie einem anerkannten Prüfinstitut im Rahmen der Eigenüberwachung fortlaufend auf die Einhaltung seiner Zusammensetzung und Eigenschaften geprüft. Damit wird eine gleich bleibende Qualität des Produktes gesichert.

Otterbein Brantkalk 77 körnig, trägt das DLG-Gütesiegel in der Premiumstufe.

Registriernummer nach CHEM BiozidMeldeV:  
N-32179, N-32184